

令和6年度 大豆ウコンノメイガ調査結果（第3回目）

| No. | 調査地名 | | 調査月日 | 天候 | ウコンノメイガ葉巻数 | | | | | | 特記事項 |
|-------|--------|--------|--------|----|------------|-----|-----|-----|-----|------|---|
| | | | | | 地点1 | 地点2 | 地点3 | 地点4 | 合計 | 平均 | |
| 1 | 柿崎区 | 下金原 | 8月5日 | 晴 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.00 | ○調査日 8月5日（月）～8月7日（水） ○調査地点 左記13地点 ○調査方法 ・ウコンノメイガ 枕地や畦畔際を除いた平均的な生育地点4カ所において、畝1m間の大豆株の葉巻数を調査する。縁がわずかに巻かれた葉も葉巻と数える。 ○調査結果 ウコンノメイガの発生数は昨年より少ない。 防除のめやすに該当する発生数は確認されなかった。 ○防除のめやす ・7月第5半旬の畝1m当たりの平均葉巻数が6個以上 防除必要 ・7月第6半旬の畝1m当たりの平均葉巻数が24個以上 防除必要 |
| 2 | 大潟区 | 東潟 | 8月5日 | 晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 頸城区 | 島田 | 8月5日 | 晴 | 0 | 2 | 8 | 1 | 11 | 2.75 | |
| 4 | 頸城区 | 大谷内 | 8月5日 | 晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 吉川区 | 竹直 | 8月5日 | 晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 頸北地域計 | | (5地点) | | | 0 | 2 | 11 | 2 | 15 | 0.75 | |
| 6 | 合併前上越市 | 本道 | 8月6日 | 曇 | 6 | 8 | 5 | 6 | 25 | 6.25 | |
| 7 | 合併前上越市 | 長者町 | 8月6日 | 曇 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 8 | 合併前上越市 | 横曽根 | 8月6日 | 曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 合併前上越市 | 福橋 | 8月6日 | 曇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 10 | 三和区 | 下中 | 8月6日 | 曇 | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2.25 | |
| 上越地域計 | | (5地点) | | | 12 | 8 | 11 | 7 | 38 | 1.90 | |
| 11 | 新井地域 | 十日市 | 8月7日 | 曇 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.75 | |
| 12 | 妙高地域 | 上中村新田 | 8月7日 | 曇 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 13 | 板倉区 | 吉増 | 8月6日 | 曇 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 頸南地域計 | | (3地点) | | | 5 | 7 | 1 | 2 | 15 | 1.25 | |
| 合計 | | (13地点) | | | 17 | 17 | 23 | 11 | 68 | 1.30 | |
| 参考 | 令和5年産 | | (18地点) | | | | | | 341 | 4.69 | |
| | 令和4年産 | | (18地点) | | | | | | 184 | 2.43 | |